Bundesministerium
Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz

Impfempfehlung COVID-19, Version 1.0 vom 31.08.2026 -

Verfügbarkeit von Comirnaty und Bimervax im Herbst 2026

Die COVID-19-Auffrischungsimpfung wird allen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr empfohlen, die das Risiko eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs reduzieren möchten. Bevorzugt im Spätsommer/Herbst wird eine einmalige Impfung mit absteigender Priorität empfohlen für:

- Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf (gelistet unter „Spezielle Indikation“, Impfplan Österreich) sowie alle Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr
- Personal des Gesundheitswesens (wegen des erhöhten Expositionsrisikos)
- Alle Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr

Tabelle 1: Impfschema COVID-19-Impfungen (Exposition = SARS-CoV2-Infektion oder COVID-19-Impfung)

	Verfügbarer Impfstoff	Impfschema Auffrischung
Kinder **ab dem vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 5. Lebensjahr**	**Comirnaty XFG 10 Mikrogramm/Dosis Injektionsdispersion (0,3 ml/Dosis); „blue cap, no dilution“**	Ohne Exposition: Grundimmunisierung bestehend aus 2 Impfungen im Abstand von 8 Wochen **Nach (jeglicher) bekannter Exposition:** einmalige Impfung **für Kinder mit Risikofaktoren empfohlen**
Kinder **ab dem vollendeten 5. Lebensjahr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr**	**Comirnaty XFG 10 Mikrogramm/Dosis Injektionsdispersion (0,3 ml/Dosis); „blue cap, no dilution“**	Einmalige Impfung **für Kinder mit Risikofaktoren empfohlen**
Kinder/Jugendliche **und** Erwachsene **ab dem vollendeten 12. Lebensjahr**	**Comirnaty LP.8.1 oder Comirnaty XFG 30 Mikrogramm/Dosis Injektionsdispersion (0,3 ml/Dosis); „grey cap, no dilution” oder Bimervax LP.8.1 oder Bimervax XFG.1.1 (0,5 ml/Dosis)**	Einmalige Impfung empfohlen **insbesondere für alle Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr und altersunabhängig für Personen mit Risikofaktoren (gelistet unter „Spezielle Indikation“) sowie Gesundheitspersonal**

Wenn an der impfenden Institution keine Kinderformulierung von Comirnaty (10 Mikrogramm) für Kinder vom vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 12. Lebensjahr verfügbar ist, kann ein Drittel der Menge (0,1 ml; 10 µg) verwendet werden, die für Erwachsene (0,3 ml; 30 µg) eingesetzt wird (off-label).

Angestrebt wird eine saisonale Impfung, d.h. die Impfung sollte vor dem wiederkehrenden Anstieg der Infektionszahlen im Spätsommer/Herbst erfolgen.

Ein Abstand zur letzten Exposition (Infektion oder Impfung) von mindestens 6 Monaten sollte eingehalten werden. Bei Personen ohne spezielle Indikation sollte der Abstand etwa 12 Monate betragen.

Immungeschwächte bzw. immunsupprimierte Personen können auch schon früher geimpft werden. Ein Mindestabstand von 4 Monaten zur vorangegangenen Exposition (bekannte SARS-CoV-2-Infektion/Impfung) sollte nicht unterschritten werden.

Sowohl Impfstoffe gerichtet gegen LP.8.1 als auch Impfstoffe gerichtet gegen XFG können im Herbst 2026 verwendet werden. Die Varianten LP.8.1 und XFG sind aus immunologischer Sicher sehr nahe verwandt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Schutzwirkung gegen derzeit zirkulierende Varianten in vergleichbarem Ausmaß gegeben ist.

Mit Stand Ende August 2026 ist für Kinder Comirnaty XFG 10 Mikrogramm (in 6er-Vials) verfügbar, für Erwachsene Comirnaty LP.8.1 30 Mikrogramm (in 6er-Vials) und Bimervax LP.8.1 (Monodosen). Wenn neue Variantenimpfstoffe verfügbar sind, so wird dies auf impfen.gv.at kommuniziert.

Ist eine Grundimmunisierung notwendig (Kinder <5 Jahren ohne Exposition; 2 Dosen im Abstand von 8 Wochen), so sollten diese beiden Impfungen mit Impfstoffen gerichtet gegen dieselbe Variante durchgeführt werden.